

# Schematherapie bij ouderen: ervaar hoe beter te verbinden!

Dr. Arjan Videler

Dr. Machteld Ouwens

Drs. Loes van Donzel

PersonaCura

Topklinisch Centrum voor Persoonlijke  
& Autisme bij Ouderen

Tranzo, Tilburg University



# Programma



- Schematherapie bij ouderen: stand van zaken
- Oefenen met life reviewoefening om positieve schema's te herkennen
- Ervaringsoefening met positieve imaginatie om positieve schema's te versterken

# TOPGGz ouderenpsychiatrie

**2014**

**GGz InGeest:  
Centrum voor  
ouderen- en  
neuropsychiatrie**



**2019**

**GGz Breburg:  
PersonaCura**



**2017**

**Mondriaan:  
Topklinisch centrum voor  
ouderen met  
persoonlijkheidsstoornissen**



**GGz Breburg**



# Perspectieven op behandeling



# Schematherapie bij ouderen: stand van zaken

## Wetenschappelijk onderzoek uitgelicht: onderzoek naar schematherapie bij ouderen

22-09-2020 Dr. A.C. (Arjan) Videler, (psychotherapeut, manager behandeling)

Binnen PersonaCura, het topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en/of autisme bij ouderen van GGz Breburg, worden verschillende behandelingen voor ouderen ontwikkeld en onderzocht, waaronder schematherapie. Schematherapie blijkt goed toepasbaar bij ouderen: het biedt een helder kader voor de oudere cliënt en sluit aan bij de natuurlijke neiging van ouderen om terug te kijken op het leven en de balans op te maken (Videler et al, 2015). Het eerste empirische onderzoek naar groepsschematherapie bij ouderen betrof een verkenning van een kortdurend protocol bij ouderen met stemmingsstoornissen en maladaptieve persoonlijkheidstrekken (Videler et al., 2014). Dit protocol bleek goed toepasbaar bij ouderen en ging gepaard met een afname van stemmingsklachten en disfunctionele schema's en modi. Deze effecten bleken echter kleiner dan bij jongere volwassenen en om die reden is het behandelprotocol aangepast specifiek voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen en als zodanig onderzocht. Deze gegevens worden momenteel geanalyseerd.

Het eerste wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van individuele schematherapie bij ouderen betrof een onderzoek bij cliënten met een cluster C persoonlijkheidsstoornis (Videler et al., 2018). Daarbij vonden we krachtige effecten op de symptomen van de persoonlijkheidsproblematiek zelf, angst- en stemmingsklachten, kwaliteit van leven en maladaptieve schema's. Dit eerste onderzoek leidde tot groot enthousiasme en werd door Arnoud Arntz betiteld als een "doorbraakstudie." Momenteel wordt deze studie gerepliceerd bij ouderen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (Khasho et al., 2019).



# Schematherapie: geknipt voor ouderen?



Videler, A.C, Van Royen, R.J.J.,  
& Van Alphen, S.P.J. (2012).  
Schema therapy with older  
adults: Call for evidence.  
*International Psychogeriatrics*,  
24(7), 1186-1187.

## Effects of schema group therapy in older outpatients: a proof of concept study<sup>‡</sup>

A. C. Videler,<sup>1,2,4</sup> G. Rossi,<sup>2</sup> M. Schoevaars,<sup>3</sup> C. M. van der Feltz-Cornelis<sup>4,5,6</sup>  
and S. P. J. van Alphen<sup>2,7</sup>

<sup>1</sup>Breburg Hospital, Department of Old Age Psychiatry, Tilburg, the Netherlands

<sup>2</sup>Department of Clinical & Life Span Psychology, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium

<sup>3</sup>Psychology Practice Schoevaars, Capelle aan den IJssel, the Netherlands

<sup>4</sup>Tilburg University, Tranzo Department, Tilburg, the Netherlands

<sup>5</sup>Clinical Centre for Body, Mind and Health, GGz Breburg, Tilburg, the Netherlands

<sup>6</sup>Trimbos Institute, Board, Utrecht, the Netherlands

<sup>7</sup>Mondriaan Hospital, Department of Old Age Psychiatry, Heerlen-Maastricht, the Netherlands

- Ouderen met chronische depressie en persoonlijkheidsstoornissen en/of trekken
- *Pre-mid-post design*: medium behandel-effect op depressie, disfunctionele schema's en schema-modi
- Hiërarchische regressieanalyses met residuele verschilcores: verandering in schema's voorspelde afname symptomen!!!

# Korte groepsschematherapie door de levensloop

<b>Studie</b>	<b>Maten</b>	<b>Effect sizes</b>
<b>Jongvolwassenen</b> Renner et al. (2013)	Klachten Schema's Modi	0,81 0,56 0,98
<b>Volwassenen</b> Vreeswijk et al. (2012)	Klachten Schema's Modi	0,66 0,75 0,50-0,65
<b>Ouderen</b> Videler et al. (2014)	Klachten Schema's Modi	0,54 0,38 0,26-0,35



# Korte groepsschematherapie door de levensloop

Studie	Maten	Effect sizes
<b>Jongvolwassenen</b> Renner et al. (2013)	Klachten Schema's Modi	0,81 0,56 0,98
<b>Volwassenen</b> Vreeswijk et al. (2012)	Klachten Schema's Modi	0,66 0,75 0,50-0,65
<b>Ouderen</b> Videler et al. (2014)	Klachten Schema's Modi	0,54 0,38 0,26-0,35

Aangepast protocol  
voor ouderen

# Aangepaste korte groepsschematherapie voor ouderen

- Twee extra sessies voor cognitieve technieken
- Meer experiëntiële technieken
- Betrekken systeem
- Werkboek aangepast voor ouderen

# Aangepaste korte groepsschematherapie voor ouderen

- Twee extra sessies voor cognitieve technieken
- Meer experiëntiële technieken
- Betrekken systeem
- Werkboek aangepast voor ouderen
  
- **Cliënten en therapeuten tevreden: past goed bij ouderen**
- **Maar effecten kleiner dan in Videler et al., 2014!?**

# Aangepaste korte groepsschematherapie voor ouderen

- Waarom minder effect en wel tevreden cliënten en therapeuten?
- Geleerde lessen:

*“Group schema therapy for older people with PDs should be treated as intensively as younger people.”*

*“When assessing acceptability of a new treatment, a mixed method design with qualitative methods is most appropriate.”*

*“When studying a new treatment, don’t change the protocol and the patients included.”*

Videler, van Beest, Ouwens, Rossi, van Royen, & van Alphen (under review).

Adapting group schema therapy for older people with personality disorders: lessons learnt



STUDY PROTOCOL

Open Access



# Group schema-focused therapy enriched with psychomotor therapy versus treatment as usual for older adults with cluster B and/or C personality disorders: a randomized trial

S. D. M. van Dijk<sup>1\*</sup>, M. S. Veenstra<sup>1</sup>, R. Bouman<sup>1</sup>, J. Peekel<sup>7</sup>, D. H. Veenstra<sup>6</sup>, P. J. van Dalen<sup>5</sup>, A. D. I. van Asselt<sup>2</sup>, M. L. Boshuisen<sup>3</sup>, S. P. J. van Alphen<sup>4</sup>, R. H. S. van den Brink<sup>1</sup> and R. C. Oude Voshaar<sup>1</sup>

## Abstract

**Background:** Several types of psychotherapy have been proven successful in the treatment of personality disorders in younger age groups, however studies among older patients are lacking. We developed a group schema-focused therapy (SFT) enriched with psychomotor therapy (PMT) for older adults with cluster B and/or C personality disorders. This paper describes the design of a randomized controlled trial (RCT). We will evaluate the (cost-) effectiveness of this therapy protocol in specialized mental health care. We hypothesize that our treatment program is cost-effective and superior to treatment as usual (TAU) in reducing psychological distress and improving quality of life in older adults treated to specialized mental healthcare.

**Methods:** A multicenter RCT with a one-year follow-up comparing group schema-focused therapy enriched with psychomotor therapy (group SFT + PMT) and TAU for adults aged 60 years and older who suffer from either a cluster B and/or C personality disorder. The primary outcome is general psychological distress measured with the 53-item Brief Symptom Inventory. Secondary outcomes are the Schema Mode Inventory (118-item version) and the Young Schema Questionnaire. Cost-effectiveness analysis will be performed from a societal perspective with the EuroQol five dimensions questionnaire and structured cost-interviews.

**Discussion:** This study will add to the knowledge of psychotherapy in later life. The study specifically contributes to the evidence on (cost-) effectiveness of group SFT enriched with PMT adapted to the needs of for older adults with cluster b and/or c personality.

**Trial registration:** Netherlands Trial Register [NTR 6621](https://www.trialregister.nl/record/trial/NTR6621). Registered on 20 August 2017.

**Keywords:** Schema focused therapy, Psychomotor therapy, Older adults, Group therapy, Personality disorders, Multicenter RCT, Cognitive techniques, Experiential techniques, Design article



## Schema therapy for personality disorders in older adults: a multiple-baseline study

Arjan C. Videler <sup>a</sup>, Sebastiaan P. J. van Alphen<sup>b,c</sup>, Rita J. J. van Royen<sup>d</sup>, Christina M. van der Feltz-Cornelis<sup>e,f</sup>, Gina Rossi<sup>b</sup> and Arnoud Arntz <sup>g</sup>

- Ouderen met een cluster C-persoonlijkheidsstoornis
- Multiple-baseline case series design:
  - wel effect zonder RCT want elke cliënt is diens eigen controle
  - compenseert voor toename van interindividuele verschillen met het ouder worden



## Schema therapy for personality disorders in older adults: a multiple-baseline study


Arjan C. Videler <sup>a</sup>, Sebastiaan P. J. van Alphen<sup>b,c</sup>, Rita J. J. van Royen<sup>d</sup>, Christina M. van der Feltz-Cornelis<sup>e,f</sup>, Gina Rossi<sup>b</sup> and Arnoud Arntz <sup>g</sup>

- Ouderen met een cluster C-persoonlijkheidsstoornis
- Multiple-baseline case series design
- **Krachtige effecten van schematherapie op persoonlijkheidsproblematiek, psychische klachten en schema's**



## Schema therapy for personality disorders in older adults: a multiple-baseline study

Arjan C. Videler <sup>a</sup>, Sebastiaan P. J. van Alphen <sup>b,c</sup>, Rita J. J. van Royen <sup>d</sup>, Christina M. van der Feltz-Cornelis <sup>e,f</sup>,  
Gina Rossi <sup>b</sup> and Arnoud Arntz <sup>g</sup>







ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

## Contemporary Clinical Trials Communications

journal homepage: [www.elsevier.com/locate/conctc](http://www.elsevier.com/locate/conctc)



### The effectiveness of individual schema therapy in older adults with borderline personality disorder: Protocol of a multiple-baseline study

D.A. Khasho<sup>a,\*</sup>, S.P.J. van Alphen<sup>b,e,f</sup>, S.M.J. Heijnen-Kohl<sup>b</sup>, M.A. Ouwens<sup>a,d</sup>, A. Arntz<sup>c</sup>, A.C. Videler<sup>a,d</sup>

<sup>a</sup> GGz Breburg, Postbus 770, 5000 AT, Tilburg, the Netherlands

<sup>b</sup> Mondriaan, Postbus 4436, 6401 CX, Heerlen, the Netherlands

<sup>c</sup> University of Amsterdam, Postbus 15933, 1001 NK, Amsterdam, the Netherlands

<sup>d</sup> Tranzo Department, Tilburg University, Postbus 901535000 LE Tilburg, the Netherlands

<sup>e</sup> Tilburg University, Postbus 901535000 LE Tilburg, the Netherlands

<sup>f</sup> Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 B-1050 Brussel, Belgium



- Diagnose borderline PS met alternatieve model DSM-5
- Veel meer leeftijdsneutraal!


# Aanpassingen schematherapie voor ouderen

*Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 2020, 48, 481–491  
doi:10.1017/S1352465820000077



EMPIRICALLY GROUNDED CLINICAL INTERVENTIONS

## Positive schemas in schema therapy with older adults: clinical implications and research suggestions

Arjan C. Videler<sup>1,2,\*</sup> , Rita J.J. van Royen<sup>3</sup>, Marjolein J.H. Legra<sup>1</sup> and Machteld A. Ouwens<sup>1,2</sup>


<sup>1</sup>PersonaCura, GGz Breburg, Tilburg, The Netherlands, <sup>2</sup>Tranzo Department, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands and <sup>3</sup>Centre for Psychotherapy, Beuningen, The Netherlands

*International Journal of Cognitive Therapy*, 10(1), 62–78, 2017  
© 2017 International Association for Cognitive Psychotherapy

## Adapting Schema Therapy for Personality Disorders in Older Adults

Arjan C. Videler

*Tranzo Department, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands; Department of Geriatric Psychiatry, GGz Breburg, Tilburg; and Department of Clinical and Life Span Psychology, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium*



# Aanpassingen schematherapie voor ouderen

<b>Technieken aanpassen</b>	
Compacte casusconceptualisatie	Maak een compacte en concrete casusconceptualisatie die in één oogopslag een overzicht geeft van relevante ervaringen als kind, core beliefs over zelf, ander en de wereld (schema's), leefregels en strategieën (coping modi).
Taalgebruik	Gebruik van eigen termen in plaats van schematherapie terminologie schept een betere band, geeft persoonlijker contact en betere compliance. Eigen termen zijn aansprekender, waardoor herinneringen geactiveerd worden, met bijbehorende emotionele lading.
Techniek van imaginatie en rescripting	<p>Diagnostische imaginatie geeft vaak een negatieve ervaring die onopgelost blijft tijdens de sessie. Voorkeur voor Imaginatie met Rescripting.</p> <p>Let op: bij ouderen kom je vaak een grotere loyaliteit naar ouders tegen, zoals de overtuiging 'eert uw vader en uw moeder'.</p>
Stoelenwerk	Eenvoudig houden door niet meer dan twee stoelen te gebruiken.
<b>Levenslopperspectief toevoegen</b>	
Integreren "Wisdom enhancement"	Levenswijsheid door eerdere ervaringen aanspreken, die is in te zetten in de gezonde volwassen modus. Bijvoorbeeld: Hoe heeft u eerder succesvol problemen opgelost?
Focus ook op positieve schema's	Zoek naar de perioden eerder in leven waarin cliënten goed gefunctioneerd hebben. In welke rol zaten ze toen? Welke gedachten hadden ze toen over zichzelf? De gezonde volwassen modus is vaak actief geweest, meestal na het 40 <sup>e</sup> levensjaar.
Negatieve opvattingen over ouder worden en psychotherapie	Wees bedacht op negatieve overtuigingen over ouderdom en over psychotherapie, zoals 'ouderen tellen niet meer mee' of 'ouderen kun je niets meer leren'.



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

## Contemporary Clinical Trials Communications

journal homepage: <http://www.elsevier.com/locate/conctc>



# The effectiveness of adapted schema therapy for cluster C personality disorders in older adults – integrating positive schemas



L. van Donzel<sup>a,\*</sup>, M.A. Ouwens<sup>b,c</sup>, S.P.J. van Alphen<sup>b,d,e,f</sup>, S. Bouwmeester<sup>g</sup>, A.C. Videler<sup>b,c</sup>

<sup>a</sup> GGZ Oost Brabant, Boekel, the Netherlands

<sup>b</sup> PersonaCura, Clinical Centre of Excellence for Personality Disorders and Autism in Older Adults, GGz Breburg, Tilburg, the Netherlands

<sup>c</sup> Tranzo Department, Tilburg University, Tilburg, the Netherlands

<sup>d</sup> Department of Clinical and Lifespan Psychology, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium

<sup>e</sup> Clinical Centre of Excellence for Personality Disorders in Older Adults, Mondriaan, Heerlen, the Netherlands

<sup>f</sup> Department of Medical and Clinical Psychology, Tilburg University, the Netherlands

<sup>g</sup> Department of Psychology, Education & Child Studies, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands

# Early Adaptive schema's

- Early Adaptive Schemas: persistente patronen van informatie-verwerken, gedachten, emoties, herinneringen en aandachtsvoorkeuren (Lockwood & Perris, 2012)

- Aparte constructen:

Daling in maladaptieve schema's betekent niet perse stijging in adaptieve schema's



# Vragenlijst: adaptieve schema's YPSQ



AMERICAN  
PSYCHOLOGICAL  
ASSOCIATION

Psychological Assessment

© 2018 American Psychological Association  
1040-3598/18/\$12.00

2018, Vol. 30, No. 9, 1199–1213  
<http://dx.doi.org/10.1037/pas0000567>

## Positive Clinical Psychology and Schema Therapy (ST): The Development of the Young Positive Schema Questionnaire (YPSQ) to Complement the Young Schema Questionnaire 3 Short Form (YSQ-S3)

John P. Louis and Alex M. Wood  
University of Stirling

George Lockwood  
Schema Therapy Institute Midwest, Kalamazoo, Michigan

Moon-Ho Ringo Ho  
Nanyang Technological University

Eamonn Ferguson  
University of Nottingham

Negative schemas have been widely recognized as being linked to psychopathology and mental health, and they are central to the Schema Therapy (ST) model. This study is the first to report on the psychometric properties of the Young Positive Schema Questionnaire (YPSQ). In a combined community sample (Manila, Philippines,  $n = 559$ ; Bangalore, India,  $n = 350$ ; Singapore,  $n = 628$ ), we identified a 56-item, 14-factor solution for the YPSQ. Multigroup confirmatory factor analysis supported the 14-factor model using data from two other independent samples: an Eastern sample from Kuala Lumpur, Malaysia ( $n = 229$ ) and a Western sample from the United States ( $n = 214$ ). Construct validity was demonstrated with the Young Schema Questionnaire 3 Short Form (YSQ-S3) that measures negative schemas, and divergent validity was demonstrated for 11 of the YPSQ subscales with their respective negative schema counterparts. Convergent validity of the 14 subscales of YPSQ was demonstrated with measures of personality dispositions, emotional distress, well-being, trait gratitude, and humor styles. Positive schemas also showed incremental validity over and above negative schemas for these same measures, thus demonstrating that both positive and negative schemas are separate constructs that relate in unique ways to mental health. Implications for using both the YPSQ and the YSQ-S3 scales in tandem in ST as well as cultural nuances from the use of Asian samples were discussed.

### Public Significance Statement

Active negative schemas (distinct thinking patterns and experiences) are associated with mental ill health. We identify the specific positive schemas that both relate to good mental health and protect

# YPSQ

56 vragen, 14 schalen:

Voldoen aan emotionele behoeften	Sociale verbondenheid
Succes	Gezonde zelfcontrole/zelfdiscipline
Rekening kunnen houden met anderen	Realistische verwachtingen
Basale gezondheid en veiligheid/optimisme	Zelfgerichtheid
Emotionele openheid en spontaniteit	Gezonde mate van eigenbelang/ zelfzorg
Zelfcompassie	Stabiele hechting
Gezonde grenzen/ ontwikkeld zelf	Gezonde zelfverzekerdheid en competentie

# Adaptieve schema's

- Ouderen hebben vaak een periode beter gefunctioneerd: minder activering van EMS en/of meer activering van EAS?
- Later in leven EMS getriggerd, bijvoorbeeld door verlieservaringen (pensionering, verlies van partner, gezondheidsproblemen)
- Anderzijds mogelijkheden met EMS om te gaan door nieuwe rollen: grootouders



# Adaptieve schema's in therapie

## Toevoegen aan casusconceptualisatie

De  
Vrolijke  
blijde kind

De  
verstandige  
gezonde  
volwassene

**Beschermers**  
kan me niets  
schelen  
onthechte  
zelfsusser  
De aanpasser  
willoze  
inschikkelijke

De criticus  
veeleisende/  
straffende  
ouder

Het gevoel  
kwetsbare/  
razende/  
impulsieve  
kind

### Positieve schema's

Ik heb een goed gezond verstand  
Ik vertrouw erop dat mensen me  
eerlijk behandelen

### Negatieve schema's

Ik ben alleen  
Ik hoor er niet bij

# Adaptieve schema's in therapie

- Activeren EAS, vergroot mogelijk de Gezonde Volwassen modus
- Vergroot toegang tot gezonde volwassenmodus tijdens experiëntiële technieken
- Uitdagen van negatief oordeel terugkijkend naar leven
- Life review zoals depressie behandeling, sluit aan bij taak in levensfase

(Videler, van Royen, Legra & Ouwens, 2020)

# Oefening herkennen positieve schema's

Groepje van 3-4 personen:

- Rol van client: Neem één van je oudste cliënten in gedachten, introduceer deze in 5 zinnen aan je groepsgenoten, speel je cliënt
- Behandelaar: pagina 1 en 2 van de handout
- Observatoren

**Wat gebeurt er bij de client?**


# Imaginatie

- Imaginaties met rescripting worden veel ingezet binnen schematherapie
- Bij ouderen zijn er aanwijzingen dat experiëntiële oefeningen zeer effectief zijn in de schematherapie behandeling (Videler et al., 2018)
- Helpt bij herinneringen en emoties te komen die niet makkelijk toegankelijk zijn.
- Biedt een opening naar het actualiseren van schema's



# Imaginatie

- Imaginaties met rescripting worden veel ingezet binnen schematherapie
- Bij ouderen zijn er aanwijzingen dat experiëntiële oefeningen zeer effectief zijn in de schematherapie behandeling (Videler et al., 2018)
- Helpt bij herinneringen en emoties te komen die niet makkelijk toegankelijk zijn.
- Biedt een opening naar het actualiseren van schema's



# Wanneer positieve imaginatie?

- Wordt ingezet om (een gebeurtenis passend bij) het positieve schema te ervaren
  - Wanneer cliënten geen ervaringen gerelateerd aan positief schema kunnen vertellen/herinneren
  - Wanneer er teveel op rationeel niveau wordt gesproken over positieve schema's
  - Wanneer cliënten zich niet meer voor kunnen stellen dat ze positieve schema's hebben ervaren



# Positieve imaginatie

- Welke gedachtes en welk gevoel past bij dit schema?
  - Ken je dit gevoel van een eerder moment in je leven?
  - Welk beeld komt er naar boven?
  - Wat zie je? Neem even de tijd om alles goed in je op te nemen.
  - Hoe oud ben je?
  - Ben je alleen of zijn er nog andere personen bij je?
- 
- Wat gebeurt er in beeld?
  - Wat denk je?
  - Welke emotie voel je?
  - Wat ruik je? Wat hoor je? Wat proef je? Wat ervaar je?

Herhalen!

# Opdracht

- Maak groepjes van 3-4 personen
  - 1 persoon neemt een positief schema in gedachten
  - 1 persoon is therapeut en voert de imaginatie uit
  - 1-2 personen observeren wat er gebeurt
- 
- Wanneer er tijd over is, draai de rollen door, iemand anders is therapeut



# Oefening


- Welke gedachtes en welk gevoel past bij dit schema?
  - Ken je dit gevoel van een eerder moment in je leven?
  - Welk beeld komt er naar boven?
  - Wat zie je? Neem even de tijd om alles goed in je op te nemen.
  - Hoe oud ben je?
  - Ben je alleen of zijn er nog andere personen bij je?
- 
- Wat gebeurt er in beeld?
  - Wat denk je?
  - Welke emotie voel je?
  - Wat ruik je? Wat hoor je? Wat proef je? Wat ervaar je?

Voldoen aan emotionele behoeften	Je hebt het gevoel dat er wordt voldaan aan je emotionele behoeftes in de vorm van warmte, affectie en begrip. Je weet dat er mensen zijn die van je houden om wie je bent.
<u>Succes</u>	Je hebt het gevoel dat je niet onderdoet voor anderen op het gebied van prestaties, bijvoorbeeld in je werk of op school. Je hebt het idee dat je net zo goed en bent op dat gebied als anderen.
Rekening kunnen houden met anderen	Je respecteert de mening van anderen, ook als deze anders zijn dan die van jou. Als er een beslissing wordt genomen die niet naar je zin zijn, kan je dit accepteren.

Herhalen!

# Na de oefening

- Zoek een symbool voor het positieve schema. Dit kan zijn in de vorm van een tekening, plaatje, liedje, voorwerp enzovoorts
- Eventueel kan de oefening worden opgenomen, zodat het thuis herhaald kan worden
- Ga na op welke manier het positieve schema weer geactiveerd kan worden. Is er een taak, rol op positie die cliënt kan nemen waardoor dit positieve schema getriggerd wordt?



# Vragen en discussie

Dank voor jullie aandacht!